

## Vad är Norlevo®?

- **Vad är NorLevo®?**

NorLevo® är ett peroralt akut p-piller som förhindrar graviditet. Tabletten kan användas som en nödlösning om kondomen, eller något annat preventivmedel, inte har fungerat som man tänkt, alternativt om preventivmedel inte har använts under samlaget.

NorLevo® innehåller 1,5 mg levonorgestrel, ett syntetiskt gulkroppshormon, som också finns i många p-piller. Tabletten fungerar effektivare ju snabbare du tar den efter ett oskyddat samlag.

Om du har hunnit bli gravid, eller blir gravid trots att du använt läkemedlet, påverkar NorLevo® inte fostret. NorLevo® är inte ett abortläkemedel.

- **Hur ska jag använda NorLevo®?**

Behandlingen består av **en tablett** som ska tas **så snart som möjligt efter ett oskyddat samlag, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar** (3 dygn) efter samlag.

Om du kräks inom tre timmar efter att du tagit tabletten ska du omedelbart ta en ny tablett.

Du kan ta NorLevo® när som helst under menstruationscykeln.

Efter behandling med NorLevo® och fram till nästa menstruationsperiod rekommenderas att du använder lokalt preventivmedel (kondom, pessar eller spermiedödande medel).

Om du använder NorLevo® samtidigt med p-piller ska du fortsätta ta dina p-piller som vanligt. Om din menstruation inte inträffar under nästa tablettfria period ska du göra ett graviditetstest för att utesluta graviditet.

- **När kan jag använda NorLevo®?**

- Om du eller din partner inte har använt preventivmedel.
- Om du har glömt att ta ditt p-piller inom den rekommenderade tiden. Läs i så fall bipacksedeln för ditt p-piller.
- Om kondomen har gått sönder, glidit av eller tagits av på fel sätt, eller om ni har glömt att använda den.
- Om du misstänker att din spiral har kommit ur läge.
- Om ditt pessar har kommit ur läge eller om du har tagit ut det för tidigt.
- Om metoden avbrutet samlag har misslyckats.
- Om du har haft samlag under den period du kan bli gravid, om du vanligtvis litar på metoden "säkra perioder".
- Efter våldtäkt.

- **Vem kan använda NorLevo®?**

Läkemedlet kan användas av kvinnor över 15 år fram till klimakteriet, med vissa undantag. Om du är under 15 år ges läkemedlet endast enligt läkares ordination.

- **Vem kan inte använda NorLevo<sup>®</sup>?**

*Du kan inte använda NorLevo<sup>®</sup> om du är allergisk mot läkemedlet.*

*NorLevo<sup>®</sup> rekommenderas inte om du tidigare har drabbats av utomkvedshavandeskap eller inflammation i äggledaren (eftersom utomkvedshavandeskapet kan fortsätta trots blödningar). Vi rekommenderar inte heller användning om du har kraftigt nedsatt leverfunktion. Svåra sjukdomar som minskar kroppens upptag av läkemedel, som Crohns sjukdom, kan försämra effekten av NorLevo<sup>®</sup>.*

- **Hur vet jag om behandlingen med NorLevo<sup>®</sup> har fungerat?**

*Efter behandling med NorLevo<sup>®</sup> kommer menstruationen oftast normalt och har normal omfattning. Menstruationen kan ibland komma några dagar tidigare eller senare.*

*Om menstruationen är försenad mer än fem dagar, eller om en onormal blödning inträffar den dagen menstruationen förväntas, ska du göra ett graviditetstest.*

*Om du använder p-piller och om ingen blödning uppstår efter nästa p-pilleruppehåll efter behandling med NorLevo<sup>®</sup> ska du göra ett graviditetstest.*

- **Hur ofta kan jag använda NorLevo<sup>®</sup>?**

*NorLevo<sup>®</sup> ska endast användas tillfälligt och den ersätter inte något annat preventivmedel.*

*NorLevo<sup>®</sup> ska inte användas fler än en gång under menstruationscykeln eftersom det kan finnas risk för störningar av menstruationscykeln.*

- **Kan NorLevo<sup>®</sup> ge biverkningar?**

*Liksom alla läkemedel kan NorLevo<sup>®</sup> ge biverkningar.*

*Några förekommande biverkningar är:*

- *illamående och kräkningar*
- *yrsel, trötthet och huvudvärk*
- *buksmärtor*
- *bröstömhet*
- *blödningsrubbningsar eller försenad blödning (graviditetstest bör göras).*

*En menstruationsliknande blödning kan uppstå när du har tagit läkemedlet.*

- **Kan jag använda NorLevo<sup>®</sup> tillsammans med andra läkemedel?**

*Samtidig användning av andra läkemedel kan minska eller förhindra effekten av detta akuta p-piller. Exempel på dessa är vissa epilepsiläkemedel, som fenobarbital, fenytoin, primidon och karbamazepin, samt rifabutin, rifampisin, ritonavir, griseofulvin och johannesört (*Hypericum perforatum*).*

*Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du använder NorLevo<sup>®</sup> om du regelbundet använder något annat läkemedel.*

- **Viktigt**

- Akut p-piller ska endast användas tillfälligt och det ersätter inte vanliga preventivmedel.
- NorLevo<sup>®</sup> skyddar inte mot könssjukdomar.
- NorLevo<sup>®</sup> ska inte användas fler än en gång under menstruationscykeln.
- Om du har behov av akut p-piller upprepade gånger bör du använda ett långvarigt preventivmedel.
- NorLevo<sup>®</sup> är inget abortläkemedel och det avbryter inte en redan påbörjad graviditet.
- Effekten av NorLevo<sup>®</sup> blir inte bättre om du tar fler än en tablett.